

*Aus dem Zahnärztlichen Universitäts-Institut „Carolinum“ zu Frankfurt a. M.
Direktor: Professor Dr. med. O. Loos*

Klinische Beobachtungen

über

„Gingivitis gravidarum“

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der zahnärztlichen Doktorwürde

der

Hohen Medizinischen Fakultät

der

Johann Wolfgang Goethe-Universität
zu Frankfurt a. M.

vorgelegt von

Ernst Stroh

Zahnarzt aus Darmstadt

Gedruckt mit Genehmigung
der
Medizinischen Fakultät der Universität zu Frankfurt a. M.

Referent: Professor Dr. Loos

Dekan: Professor Dr. Holfelder



Eine entzündliche und hypertrophische Veränderung der Gingiva zur Zeit der Schwangerschaft und deren Rückbildung zum Normalzustand nach der Entbindung wurde schon 1840 von J o h. N e p. E i f e l t Med. Doktor, Magister der Geburtshilfe, kk. Kreisphysikus in Tabor beschrieben. Auf Grund des für die damalige klinische Beobachtung geradezu typischen Falles möge es mir erlaubt sein, E i f e l t im Original zu zitieren: „Gräfin N., eine schöne, groß gewachsene Dame, von sanguinischem Temperamente, mit dunkelbraunem Haupthaare, üppig und kräftig gebaut, an 30 Jahre alt, sonst vollkommen gesund, nie an Schmerzen der weißen gefunden Zähne leidend, bekam vor drey Jahren bey der ersten Schwangerschaft zwischen der vierten und fünften Schwangerschaftswoche das obengenannte Uebel. Das Zahnfleisch begann sowohl am Ober- als auch am Unterkiefer zu wuchern, wurde röther, am unteren Rand breiter und blutete bey der geringsten Berührung. Ein übler Geruch oder Geschmack im Munde war nicht wahrnehmbar. Bey dem Fortschreiten wuchs das Zahnfleisch stärker an, wurde dicker höckerig und bildete in den Zwischenräumen der Zähne lappige, gezackte freye Fortsätze, die jedoch die Zahnkronen nicht überragten. Schmerz war keiner vorhanden, bloß ein unangenehmes Gefühl beym Kauen fester Speisen durch die leicht entstehende Blutung; die Speichelabsonderung war etwas vermehrt. Gegen dieses Uebel wurde bloß Auspülen des Mundes mit kaltem Brunnenwasser, später mit einem kalten weinigen Aufguß von Salbey- und Rosmarinblättern gebraucht. Die Hypertrophie dauerte die ganze Schwangerschaftszeit; nach der Entbindung eines gefunden Mädchens fing sie an zu schwinden, und das Zahnfleisch kehrte binnen drey Wochen zur normalen Beschaffenheit zurück. 1838 wurde die Gräfin wieder schwanger, gegen die fünfte Woche trat das genannte Uebel neuerlich hervor, hielt die ganze Schwangerschaft an, und schwand nach der Geburt eines gefunden Mädchens. Gegenwärtig ist die Gräfin im achten Monat schwanger, und leidet bereits seit sechs Wochen wieder an denselben Symptomen der Zahnfleisch-Hypertrophie.“

Auch K a r n e r beschreibt einen ähnlichen Fall. Ihm erzählte eine Patientin: „daß, so oft sie in die Hoffnung käme, ihr Zahn-

fleisch am Unterkiefer ganz locker werde, so zwar, daß sie es von den Zähnen abnehmen und über die Unterlippe ziehen konnte.“ Seine Unterredung ergab, daß das Zahnfleisch bedeutend angewulstet war, stark gerötet, am Unterkiefer aber derart von den Schneidezähnen losgelöst sei, daß es bequem und schmerzlos über die Unterlippe gelegt werden konnte. Die Zähne waren dessenungeachtet fest, und das Kauen ging anstandslos vonstatten. Das übrige Zahnfleisch war wohl gewulstet, aber nicht losgelegt. Dieser Zustand soll nach Aussage der Schwangeren jedesmal bei den vorhergegangenen Schwangerschaften in derselben Art eingetreten sein. Nach der Entbindung verlor sich die Answulstung allmählig, das Zahnfleisch erhielt wieder seine normale Beschaffenheit und legte sich wieder fest an die Zähne an. Die Anschwellung des Zahnfleisches und dessen Lockerwerden sei ihr auch stets das sicherste Zeichen der Schwangerschaft.“ P i n a r d, A r k ö v y und B i r o haben Veränderungen der Gingiva, die sie einzig und allein auf die Schwangerschaft zurückführen, festgestellt. Ersterer hat bei einer Untersuchung von 75 Schwangeren, bei 45 eine Hypertrophia gingivarum „ginpodis“ festgestellt. B i r o und A r k ö v y legen klar das Krankheitsbild der „Gingivitis diffusa gravidarum“ fest. Die Färbung des Zahnfleisches ist „eine scharlachrote und keine grauweiße oder dunkelrote wie bei der katarrhalischen Gingivitis“. Bei der Gingivitis diffusa gravidarum sind es vorzugsweise die Ränder des Zahnfleisches, welche gerötet und geschwollen erscheinen.

Die auf Grund von klinischen Beobachtungen zur Zeit der Schwangerschaft festgestellten Veränderungen der Gingiva und als Gingivitis gravidarum durch A r k ö v y und B i r o modifizierte Form des Krankheitsbildes wird durch eine Anzahl Autoren stark bestritten. Man ist der Ansicht, daß es eine spezielle, nur zur Zeit der Schwangerschaft auftretende und als Gingivitis gravidarum bezeichnete Form der Gingivitis nicht gibt, sondern daß die so häufig in der Gravidität auftretenden Gingivitiden identisch sind mit den gewöhnlichen Formen der Gingivitis. R o s e n s t e i n schreibt: „Bei Patientinnen, die nicht an Mundpflege gewöhnt sind, die Zahnsteinablagerungen und Wurzelreste im Munde haben, wie sie den größten Teil des Materials der Polikliniken ausmachen, sieht man in der Mehrzahl der Fälle auch außerhalb der Schwangerschaft geringere oder stärkere Grade von Entzündungserscheinungen an der Mundschleimhaut, sodaß Beobachtungen an solchen nichts beweisen können“. C o l e s hat niemals an der Gingiva einen Zustand beobachtet, der speziell und allein als Folge „der Schwangerschaft angesehen werden kann“. Die Beobachtungen von A m o e d o

und Charpentier sind dieselben, sie beruhen zum weitaus größten Teil auf Gingivitis mit Zahnstein bedeckten Zähnen. Houpert glaubt außer dem Zahnstein noch die Hyperemesis und die hierdurch herabgesetzte Kautätigkeit als aetiologisch in Anspruch nehmen zu können. Hirsch legt dem Krankheitsbild eine toxische, eine Selbstvergiftung von den Genitalien aus zu Grunde. Disbury sieht in einer verminderten Widerstandskraft gegen Infektionen, hervorgerufen durch mangelhafte Blutversorgung, die Aetiologie der Gingivitis gravidarum.

Auf Grund dieser oben geschilderten verschiedenartigsten Ansichten über die Gingivitis gravidarum wurde mir die Aufgabe gestellt zu untersuchen:

1. Gibt es überhaupt eine Schwangerschaftsgingivitis?
2. Welche Personen werden von der Schwangerschaftsgingivitis befallen?

Rosenstein, Coles, Amoedo, Charpentier und Herrenknecht haben immer bei einer, übrigens nach ihrer Ansicht überhaupt nicht existierenden Schwangerschaftsgingivitis starken Zahnsteinanatz gefunden und machen diesen für eine entzündliche Veränderung der Gingiva verantwortlich; sie bestreiten auf das entschiedenste das Vorhandensein einer spezifischen auf der Schwangerschaft beruhenden entzündlichen Veränderung der Gingiva (Gingivitis gravidarum). Die Untersuchungen dieser Autoren dürften aber insofern der Grundfrage nicht gerecht werden, als sie den gingivalen Zustand nicht von dem Zeitpunkt der festgestellten Schwangerschaft bis zur Entbindung und auch noch nach der Entbindung beobachtet haben dürften. Denn nur nach solchen Untersuchungsmethoden hätten dieselben ein, wenn auch subjektives, so doch zuverlässiges Urteil abgeben können. Es wird sich meines Erachtens bei obengenannten Autoren zur Beobachtung gelangter Fälle um eine Gingivitis tartarica oder um eine katarrhalische Gingivitis gehandelt haben. Wertvoller dürften die Angaben von Pinard und Freund sein, denn diese stützen ihre Beobachtungen auf Untersuchungen vom zweiten bis vierten Graviditätsmonat ab bis zur, ja sogar nach der Entbindung und dieselben kommen zur Ueberzeugung, daß es tatsächlich eine Gingivitis gravidarum gibt. Freund beschreibt in geradezu charakteristischer Weise das Krankheitsbild der Schwangerschaftsgingivitis: „Es handelt sich um eine dauernde Kongestion und Hypertrophie des Zahnfleisches (Hypertrophia gingivarum, „Gingivitis“), die selten schon im zweiten, gewöhnlich erst vom vierten Graviditätsmonat ab nachzuweisen

ist, in verschiedengradiger Mächtigkeit die ganze Schwangerschaft über besteht und erst mit Ablauf des Puerperiums, sechs bis acht Wochen nach der Geburt wieder völlig verschwindet. Die erste Erscheinung ist eine starke Hyperämie, welche nicht nur dem ganzen Zahnfleisch eine gleichmäßig stärkere Rötung verleiht, sondern ganz besonders um die Zahnbasis herum lebhaft rotgefärbte Halbmondchen erkennen läßt. Später schwillt das Zahnfleisch auf, am Ober- und Unterkiefer fast gleich stark, über den Schneidezähnen und Prämolaren aber stärker als über den Molaren. Es bekommt ein ödematöses Aussehen, bildet manchmal isolierte polypöse Exkreszenzen, schiebt sich nicht nur verschieden weit über die Frontalfläche der Zähne, sondern auch ganz besonders zwischen die einzelnen Zähne und lockert diese daher in schwereren Fällen beträchtlich. Blutungen aus solchem Zahnfleisch, nicht nur beim Berühren, Zahnputzen, Kauen, sondern auch spontan sind sehr häufig. Die Angaben von A m o e d o, daß die Entbindung keine Besserung, im Gegenteil oft Verschlimmerung zur Folge habe, beweisen, daß es sich um keine bei diesen Fällen spezifische Gingivitis gravidarum, etwa um einen Folgezustand der Schwangerschaft handeln dürfte.

Die Beobachtungen folgender Autoren, die Schwangere auf das Bestehen einer Gingivitis gravidarum hin untersucht haben:

Pinard:	75 Schwangere	45 Ging. grav. 60 %
Freund:	100 Schwangere und Wöchn.	53 Ging. grav. 53 %
Grüner:	150 Schwangere und Wöchn.	66 Ging. grav. 44 %
Biro:	200 Schwangere	77 Ging. grav. 38 %

(unter Ausschaltung aller mit pathologischen Zahnsteinablagerungen einhergehenden Fälle) lassen die Frage offen, wird jede Schwangere von einer Gingivitis gravidarum befallen, wenn nein, welche Schwangere haben an dieser Krankheit zu leiden und welche nicht?

Zur Klärung der in der Literatur auf das Schärfste sich widersprechenden Angaben bezüglich der Existenz der Gingivitis gravidarum wurden von mir 50 Schwangere untersucht. Die Gingiva der Schwangeren wurde vor der Entbindung teilweise vom dritten Monat, vom Zeitpunkt der Conceptio an gerechnet, bis nach der Entbindung beobachtet. Die Befunde und anamnестischen Erhebungen wurden in, von der Arbeitsgemeinschaft für Parodontoseforschung herausgegebenen großen Parodontosestaten aufgenommen. Dementsprechend wurde bezüglich interner Erkrankungen die Anamnese erhoben und die Befunde im Parodontosestatus aufgenommen. Es wurde gefahndet nach Metallvergiftungen (durch Beruf, Kuren, Amalgamchäden, Gewerbekrankheiten,) Gicht, Ar-

thrititis deformans, akuter oder chronischer Gelenkrheumatismus, Diabetes, Nephritis, Blutkrankheiten, Magen- und Darmkrankheiten, Leber-, Gallenleiden, Unter- und Ueberernährung, nervös-psychische Störungen (Krämpfe, Lähmungen, Epilepsie), Tuberkulose, Lues, andere Infektionskrankheiten (chronische Tonsillenerkrankung, Malaria, Grippe usw.), Hautkrankheiten, vasomotorische Störungen (echte Migräne, kalte Füße und Hände, Frost), allergische Krankheiten (Asthma, Urticaria, Heuschnupfen), Avitaminosen, Lymphatismus, Zahl, Zeit und Verlauf der Geburten (Aborte), Verhalten der Menses, Erkrankung des Uro-Genitalapparates. Der allgemeine Körper- und Organbefund wurde aus den Krankheitsberichten der Frauenklinik des städtischen Krankenhauses aufgenommen.

Abgesehen von den anamnestischen Erhebungen bezüglich des Intern- und Graviditätsbefundes wurden aufgenommen: 1. Mundbefund (Viscosität des Speichels, a) dünnflüssig, b) fadenziehend, Zunge (subjektive und objektive Veränderungen), Wangenschleimhaut, harter Gaumen, weicher Gaumen, Uvula, Tonsillen, Pharynx, Chaim'sche Drüse, (ödematös-induriert-cystisch). 2. Allgemeiner Körper- und Organbefund (Körpergröße und Gewicht, Knochenbau, Fettpolster, spärlich, reichlich, von normaler Verteilung), Haut- bzw. Schleimhäute (gut durchblutet, blaß spastisch, feuchttrocken), Behaarungsanomalien (Pigmentierungen wo) Oedeme Cyanose). 3. Urinbefund: Eiweiß. 4. NervenSYSTEM: Pupillenreflexe, Patellarreflex). 5. Blutbefund hinsichtlich Wassermannreaktion. Diese Feststellungen in dieser Richtung wurden der Einfachheit halber nur gebracht und hier notiert, wenn sie für die spezifische Untersuchung hinsichtlich der Frage der Schwangerschaftsgingivitis von Interesse sein dürften.

Der Verlauf der Gravidität wurde ständig beobachtet. Der Mundbefund wurde in Intervallen von acht bis vierzehn Tagen kontrolliert, und etwaige Veränderungen der Gingiva sofort registriert. Die Untersuchten waren sogenannte Hauschwangere, d. h. Gravide, die ihren Lebensunterhalt und die Kosten der Entbindung durch zu leistende leichte Arbeit bestritten. Durch deren gewissermaßen stationäre Aufnahme war es möglich die Untersuchung einwandfrei durchzuführen.

Von 50 untersuchten Schwangeren hatten nur 12 eine gesunde Gingiva, bei 38 dagegen waren Affektionen der Gingiva oder des Parodontiums nachzuweisen.

Vom klinischen Gesichtspunkt aus betrachtet konnte man feststellen:

- 1 Fall von Stomatitis mercurialis nach Neo-Salvarsanapplikation.
- 4 Fälle von Gingivitiden (keine Gingivitis gravidarum).
- 10 Fälle von Parodontose.
- 23 Fälle von Gingivitis gravidarum.
- 12 Fälle ohne Veränderungen der Gingiva.

Bei den 23 als Gingivitis gravidarum diagnostizierten Fällen handelt es sich um entzündliche Veränderungen der Gingiva, die nur zur Zeit der Gravidität auftreten und nach der Entbindung spontan abheilen. Als Beleg werden im folgenden einige als Gingivitis gravidarum diagnostizierten Fälle beschrieben.

Fall O. B. 20 Jahre alt, vierter Schwangerschaftsmonat. Bluten des Zahnfleisches beim Zähneputzen seit dem fünften Schwangerschaftsmonat, seit dieser Zeit ständiges Zunehmen, 10 Tage nach der Entbindung Gingiva ohne Befund. Vor 2 Jahren Nierenbecken-erkrankung; oft Anginen, Tonsillektomie (1932), Urticaria bei Luftveränderung, Patientin klagt über kalte Füße und Hände; keine Diphtherie, Scharlach, Masern, Wasserblattern; Körper- und Organbefund normal.

Fall H. M. 24 Jahre alt, fünfter Schwangerschaftsmonat. Bluten beim Zähneputzen, morgens Blut im Mund, seit 14 Tagen. 8 Tage nach der Entbindung Gingiva gut durchblutet und straff anliegend; akuter Gelenkrheumatismus bei der ersten Gravidität, Patientin hat nach Apfelsinengenuß Exanthem, oft kalte Füße; eine Geburt normal, Körper- und Organbefund normal.

Fall R. E. 21 Jahre alt, siebter Schwangerschaftsmonat, im achten Graviditätsmonat Bluten der Gingiva, nach der Entbindung Gingiva ohne Befund; als Kind Stomatitis ulcerosa, bei Eintritt der Menses Herpes labialis, Scrophulose, angeblich bis zum 14. Lebensjahr kalte Füße und Hände, oft Anginen; 3 Wochen nach der Entbindung Gingiva ohne Befund, Körperbefund mittelmäßig.

Fall S. J. 23 Jahre alt, sechster Schwangerschaftsmonat, starkes Bluten beim Zähneputzen, morgens Blut im Mund, 14 Tage nach der Entbindung Gingiva ohne Befund; akuter Gelenkrheumatismus, Patientin neigt zu Erkältungen; Körper- und Organbefund normal.

Fall E. M. 22 Jahre alt, fünfter Schwangerschaftsmonat, seit dem dritten Schwangerschaftsmonat Bluten beim Zähneputzen, 10 Tage nach der Entbindung Gingiva normal. Rachitis, Neigung zu Anginen, stark nervös; Körper- und Organbefund normal.

Fall H. K. 20 Jahre alt, fünfter Schwangerschaftsmonat, seit zwei Monaten Bluten der Gingiva beim Zähneputzen und Essen, Gin-

giva 14 Tage nach der Entbindung ohne Befund; mit dreizehn Jahren Tuberkulose, vor zwei Jahren akuter Gelenkrheumatismus, als Kind stark nervös, mit fünfzehn Jahren Herzneurose, oft Angina, letzte Zeit starke Schweißabsonderung, besonders nachts, Körper- und Organbefund normal.

Fall A. E. 22 Jahre alt, fünfter Schwangerschaftsmonat, starkes Bluten der Gingiva beim Bürsten der Zähne, vierzehn Tage nach der Entbindung Gingiva normal; labiles Nervensystem, oft Grippe und Angina; während der Gravidität starker Fußschweiß, Struma, Körperbefund normal.

Die auf Grund klinischer Beobachtungen als Gingivitis gravidarum bezeichnete entzündliche Reaktion der Gingiva entstand nach meinen Beobachtungen meistens in ihren Anfängen in der Zeit zwischen dem vierten und siebten Schwangerschaftsmonat. Es zeigte sich zuerst ein schmaler am Rand der Gingiva verlaufender roter für die Gingivitis gravidarum geradezu spezifischer Saum. Dann ergriff die Entzündung in ausgesprochener Form das ganze Zahnfleisch mehr oder weniger; die Papillen vergrößerten und verdickten sich mehr und mehr. Der Abheilungsvorgang ging in umgekehrter Richtung vor sich, sodaß gegen Schluß ein dem Beginn der Krankheit ähnliches Bild entstand.

Das Bild der Gingivitis gravidarum ist durchaus charakteristisch und kann durch eine gewisse livide Farbnuance von den anderen Gingivitiden klinisch unterschieden werden; sie zu bezeichnen und zu erkennen setzt allerdings eine große Übung voraus. Die Darstellung in Aquarellen oder Farbphotos gibt die Tönung kaum richtig wieder, selbst nicht die klassischen Abbildungen von Arkövy.

Der Zeitpunkt des ersten Anfangs der sichtbaren Veränderung der Gingiva bei der Gingivitis gravidarum genau festzulegen, ist meines Erachtens unmöglich, dürfte auch für den Verlauf derselben bedeutungslos sein.

Nach P i n a r d ist der 4. Monat, nach D i s b u r y der 2. Monat, nach F r e u n d und G. S c h e f f der 4. Monat der Zeitpunkt, von dem aus eine Gingivitis gravidarum beobachtet wurde.

Ebenso widersprechend sind die Angaben betreffend die D a u e r der Gingivaveränderung. H. W. F r e u n d und G. S c h e f f legen die Dauer auf sechs bis acht Wochen post partum fest.

Wenn nach A m o e d o die Entbindung keine Besserung bringt, so dürfte es sich aber bei diesen Fällen nicht um eine spezifische Gingivitis gravidarum, so wie wir es aus den bis jetzt gemachten Ausführungen annehmen können, handeln, vielmehr um eine se-

cundäre Gingivitis, die infolge des erneuten Zahnsteinansatzes fort-dauerte, als hartnäckige Gingivitis tartarica. Dafür sprechen auch unsere eigenen Beobachtungen, siehe unten. G. Sch e f f gibt sogar an, daß bei stillenden Frauen der veränderliche Zustand der Gingiva noch mehrere Monate andauert. Auch gegen diese Auffassung dürfte auf Grund unserer Untersuchungen mit Recht gewisse Bedenken bestehen.

Die vollkommene restitutio ist meines Erachtens nach abhängig von der Intensität und der durch sie bedingten längeren Dauer der Affektion. Im allgemeinen können nach den gemachten Beobachtungen zehn Tage bis drei Wochen angenommen werden.

Die Frage: gibt es eine Gingivitis gravidarum? dürfte wie folgt beantwortet werden. Der Umstand, daß zu einer gewissen Zeit (— nur während der Gravidität! —) eine entzündliche Veränderung der Gingiva, zunächst eine Hyperämie, dann eine am Gingivrand verlaufende lebhaft rot gefärbte Veränderung von spezifischer Farbe besteht, die nach der Entbindung spontan abheilt, gibt das Recht gegenüber anderen Gingivitisformen des alltäglichen Lebens und deren Verlauf von einer spezifischen Form, nämlich eben der „Gingivitis gravidarum“ zu sprechen.

Bei den anderen vier als Gingivitiden bezeichneten Fällen lag in einem Fall von vornherein eine chronische Gingivitis, in zwei Fällen eine Gingivitis tartarica und in einem Fall eine chronische katarthaltische Gingivitis vor.

Die schon eingangs erwähnte durch verschiedene Autoren aufgestellte „Zahnsteintheorie“ als aetiologisch für die Gingivitis gravidarum zu betrachten bzw. dieselbe als eine gewöhnliche „Schmutzgingivitis“ aufzufassen, ist nach den durchgeführten Untersuchungen als völlig irrig anzusehen. Zugegeben, daß der Zahnstein als Reiz- und Infektionskomponente gerechnet werden kann, — ausschlaggebend für die Gingivitis gravidarum ist er niemals.

Die bei allen Untersuchten festgestellte und anamnestisch erhobene Mundhygiene mußte als vollkommen einwandfrei angesehen werden. Der vorhandene Zahnsteinansatz lag vollkommen im Bereich des nicht krankhaften, d. h. es war meist nur supragingivaler Zahnstein im unteren Schneidezahnbereich festzustellen, im Oberkiefer überhaupt keine makroskopisch nachweisbare Spuren. Die Einwendung, daß es sich hier um poliklinisches Material handle und infolgedessen eine schlechte Mundhygiene vorliege, trifft nach den festgestellten hygienischen Verhältnissen nicht zu. Die bezüglich der Mundhygiene aufgenommenen anamnestischen

Erhebungen ergaben, daß die Untersuchtenangaben vor der Schwangerschaft immer ihre Zähne mit Chlorodont (es wurde immer Chlorodont angegeben) und einer Bürste geputzt haben. Während der Schwangerschaft selbst bezw. der stationären Aufnahme konnte tatsächlich festgestellt werden, ohne daß man die Patientin in irgend einer Richtung beeinflußt hätte, daß ihre Angaben den Tatsachen entsprachen. Der Zustand ihres Gebisses konnte vollkommen in Einklang gebracht werden mit der angegebenen Zahnpflege. Ausgenommen von diesen Fällen müssen selbstverständlich die vier festgestellten Gingivitiden (keine *Gingivitis gravidarum*) gerechnet werden; denn in diesen Fällen lag eine Vernachlässigung der Mundhygiene vor. Abgesehen von diesen Feststellungen kann man doch heute im allgemeinen annehmen, daß Frauen besonders in diesem Zustande eine gute, wenn nicht sogar eine stärkere Mundpflege treiben.

Es wäre nun zu untersuchen, welche Individuen von einer *Gingivitis gravidarum* befallen werden und welche nicht. Zur Klärung dieser Frage dürften wohl die aufgenommenen Internbefunde von größter Wichtigkeit sein. Zur besseren Uebersicht wurden dieselben tabellarisch zusammengestellt.

Zahl der untersuchten Schwangeren: 50

Gingivitis gravidarum:	23
Paradentose:	10
Gingivitis (k. G. gr.):	4
Stomatitis mercurialis:	1
Gefunde Gingiva:	12

Gingivitis gravidarum: 23

- 6 vasomotorische Störungen + Neigung zu Anginen (kalte Füße und Hände),
- 8 acuter Gelenkrheumatismus + vasomotorische Störungen + Neigung zu Anginen (4 Fälle vasolabil),
- 3 vasomotorische Störungen + vasolabil, Neigung zu Anginen,
- 1 vasolabil + Neigung zu Anginen,
- 1 vasomotorische Störungen + vasolabil,
- 4 vasomotorische Störungen + Neigung zu Anginen + Urticaria.

Gefunde Gingiva: 12

Die Patientinnen gaben alle an, noch niemals ernstlich krank gewesen zu sein. Anamnestisch ließen sich keine spezifischen Erhebungen machen. Von Interesse dürfte aber der Fall St. C. sein.

Fall St. C. 34 Jahre alt, beobachtet vom fünften Schwanger-

schaftsmonat bis drei Wochen post partum. Die Patientin gab an, noch niemals in ihrem Leben krank gewesen zu sein. Die Frage der Mundhygiene wurde ganz offen dahin beantwortet, daß die Patientin drei Jahre lang keine Zähne geputzt habe. Es fand sich leichter supragingivaler Zahnsteinanatz, aber keinerlei klinische Veränderung der Gingiva, dieselbe war gut durchblutet, hatte ein frisches Aussehen und lag straff an.

Die oben festgelegten Internbefunde bei den als Gingivitis gravidarum diagnostizierten Fällen dürften zu weiteren Erörterungen Veranlassung geben. O. L o o s glaubt, daß die Gingivitiden sich „zu einem Teil aus einer konstitutionellen Minderwertigkeit und einer lokalen Insuffizienz ergeben“ und faßt unbeschadet der mangelnden Zahn- und Mundpflege als des auslösenden Momentes die marginale Gingivitis als eine klinische Erscheinung der exsudativen Diathese auf, ebenso wie die sich daraus entwickelnde Parodontose Jugendlicher und Erwachsener als eine Spätererscheinung der allergisch arthrischen Diathese. S e i t z sieht in der Gingivitis gravidarum „die sekundäre Folge des veränderten Tonus des vegetativen Nervensystems“ und bezeichnet die Schwellung und Hypertrophie des Zahnfleisches als Gingivitis. H. R. S c h m i t t hat auch Zahnfleischveränderungen während der Schwangerschaft beobachtet und macht darüber folgende Angaben: „Es handelt sich hierbei aber zunächst nicht um eine Entzündung, sondern lediglich um eine innersekretorische bedingte, hyperämisch ödematöse Zahnfleischschwellung, ähnlich der Schwellung des Gewebes, wie man sie unter dem Einfluß der Schwangerschaft an den inneren Genitalien beobachten kann. Eine Entzündung schließt sich oft an, ist dann aber immer sekundärer Natur und bedingt durch Zahnsteinbildung und mangelnde Pflege um so mehr, als die gewucherten Zahnfleischpapillen tiefe Zahnfleischtaschen bilden und Speisereften Retention ermöglichen. Diese Hypertrophie, welche gelegentlich zu Blutungen neigt, kann zur Lockerung der Zähne und zur Ablösung des gewucherten Zahnfleisches vom Kiefer führen.“ S c h m i t t stellte fast etwa bei 60 % aller Graviden eine Gingivitis fest, und führte zum Vergleich Untersuchungen bei Nichtgraviden derselben Bevölkerungsklasse durch und diagnostizierte hier in etwa 15 bis 18 % eine Gingivitis. Nach seinen Beobachtungen beginnt die Gingivitis etwa im dritten bis vierten Monat und verstärkt sich mit dem Fortschreiten der Schwangerschaft. Nach der Geburt verschwindet die Schwellung auch wieder in den folgenden sechs bis acht Wochen. Das Auftreten in der Schwangerschaft und Verschwinden nach der Geburt, das Wiederauftreten bei erneuter Schwangerschaft

und die Beobachtungen bei der Menstruation weisen darauf hin, daß die Zahnfleischschwellungen in inniger Beziehung zu der innersekretorischen Funktion der Ovarien stehen, daß sie also hormonal vasomotorisch bedingt sind. Da man häufig auch eine Entzündung außerdem noch antrifft, scheint das verdickte Zahnfleisch den Zahnsteinanfaß und die Retention von Speisereften zu begünstigen und dann auf diesen entzündlichen Reiz stark zu reagieren“. Auch L o o s glaubt gestützt auf Untersuchungen von E u f i n g e r (die Kolloidstruktur des Plasmas während der Gestationsperiode), daß der Gefäßtonus in Verbindung mit der Schwangerschaftsgingivitis stehe: „Denn solche Zusammenhänge mit der Entzündungsbereitschaft verdienen aber noch auf einem viel umstrittenen also unklaren Gebiet unsere zahnärztliche Aufmerksamkeit. Ich meine die Schwangerschaftsgingivitis, wenn ich auch noch nicht behaupten kann, daß sie für die Entstehung der Parodontosen bevorzugte Bedeutung habe. Klinisch wenigstens ist eine innigere Abhängigkeit noch nicht bewiesen. Die Untersuchungen von E u f i n g e r über „Die Kolloidstruktur des Plasmas während der Gestationsperiode“ haben uns jedoch veranlaßt, auch in dieser Richtung Untersuchungen anzustellen. E u f i n g e r bestätigt die bereits von W e s t p h a l festgestellte Tatsache, daß der durch Aether nicht ausschüttbare hydrophobe Anteil des Cholesterins bis zur Geburt progressiv zunimmt; es ist also in der Schwangerschaft das Cholesterin fester gebunden und ein relativ geringer Anteil leicht disponibel. Dabei ist die absolute Cholesterinmenge in der Schwangerschaft vermehrt. Außer der veränderten Verankerung des Cholesterin wirken aber noch nach E u f i n g e r die veränderte Plasmastruktur, die Verschiebung der Eiweißfraktion des Serums nach der grobdispersen Seite, die erhöhte Kolloidlabilität auf die Zelloberfläche und haben eine Steigerung der Permeabilität zur Folge. Diese bedingt die veränderte Tonuseinstellung und Ansprechbarkeit der Gefäße und gefäßtonisierenden Stoffe. Die festere Kuppelung im Serum ist die Ursache der gesteigerten Retention und der gestörten Ausscheidung des Cholesterins“. C h a i m spricht in seiner grundlegenden Arbeit: „Der hypertonisch-spastische Typ im Bilde der Parodontose“ hinsichtlich der parodontalen Erkrankung von einer Bereitschaft zur Parodontose „durch jahrelange Beobachtungen bei Patientinnen mit endokrinen Störungen fand ich eine erhöhte Bereitschaft zur Parodontose bei Patientinnen mit thyreotoxischen Symptomen und ovariellen Dysfunktionen; ferner während der Schwangerschaft, nach Aborten und schließlich im Stadium des Klimakteriums.“ Er stellt fest, daß das Parodontium (fo-

mit auch die Gingiva) in engster Beziehung mit dem Gesamtorganismus stehen.

Bemerkenswert dürften auch die therapeutischen Beobachtungen sein. In keinem Fall wurde von mir Zahnstein entfernt, um darzutun, daß ihm bei der reinen Gingivitis gravidarum aetiologisch keine Bedeutung zukommt. Bei allen Patientinnen war, wie schon weiter oben ausführlich festgelegt, bei Beginn der Krankheit zuerst eine Hyperämie am gesamten Gingivalrand und dann eine mehr oder weniger starke Entzündung der gesamten Gingiva zu beobachten. Da ich feststellte, daß alle Patientinnen Zahnpasta und Bürste vor und auch während der Schwangerschaft als Reinigungsmittel benutzten, wurde den Patientinnen empfohlen, zunächst keine Zahnpasta zu benutzen; die Bürste wurde durch einen um den Zeigefinger gewickelten Gazestreifen ersetzt. Dadurch wollte ich jeden unnötigen, unter Umständen entzündungsfördernden Reiz ausschalten. Statt Zahnpasta wurden Kamillozon-Tabletten als Mundspülmittel verordnet. Der Erfolg muß als sehr gut bezeichnet werden, denn das als unangenehm empfundene Bluten der Gingiva hörte meistens auf, außerdem lobten alle Patientinnen einen „frischen Geschmack“ im Munde. Bei Entziehung der Kamillozon-Tabletten trat der alte Zustand sofort wieder auf. Der Koppelung in den Kamillozon-Tabletten der H_2O_2 -Wirkung, die allen organischen Detritus abschwemmt, mit der Heilwirkung des Kamillenextraktes dürfte diese besondere Heilungstendenz zu verdanken sein. Es konnte trotz der bestehenden Disposition zur Gingivitis gravidarum bei dieser einfachen Mundpflege keine chronische Gingivitis, keine Gingivitis tartarica (als etwaiger Folgezustand der Gingivitis gravidarum) beobachtet werden. Ähnlich dürfte auch das Ausbleiben der Hg.-Schädigung (Sulfitfaumbildung) bei guter Mundpflege trotz der bestehenden Disposition in Gestalt des konstitutionellen spastisch-hypertonischen Kapillarenzustandes (Hermann Scholl) liegen. Obwohl niemals Schwundtendenz vorlag, wurde doch in Anbetracht der (hypothetischen) Aetiologie der marginalen Entzündung (Zirkulationsstörung in den Kapillaren des marginalen Paradentiums, durch Erschütterungen — (remittierend!) Hyperämie, Stauungsanämie (?) durch Kompression) auf Vorliegen Karolyeffektes, d. h. auf Belastungsstörungen und Artikulationsgleichgewichtsstörungen geachtet. Der spontane Rückgang der Schwangerchaftsgingivitis bei allen Fällen ohne Aenderung etwaiger Ueberbelastungen und Artikulationsgleichgewichtsstörungen zeigte, daß äußere Momente bei der Entstehung der Gingivitis gravidarum keine wesentliche Rolle spielen.

Chaim sieht in Kapillarveränderungen, besonders auch in denen des Zahnfleisches („Spiegelbild der Kapillarpathologie“) die Folge einer allgemeinen Gefäßneurose. Die Kapillarspasmen, die wie er ausführt, auch in einen atonischen Zustand übergehen können, betrachtet er als mitverantwortlich für die Entstehung von Zahnfleischbluten und Zahnlockerungen (hauptsächlich bei Schwangeren). Auch Burkhard hält die Gingivitis gravidarum für bicausal (durch Veranlagung plus Schwangerschaft) und er beobachtet in allen Fällen eine Veränderung der Kapillaren, die nach seiner Ansicht im Sinne einer Verschlechterung der Funktionsfähigkeit des Gewebes ausgedeutet werden muß.

Die von mir durchgeführten Untersuchungen über die Gingivitis gravidarum ergaben hinsichtlich der Disposition ein so klares Bild, daß es möglich war, allein auf Grund der internen anamnestischen Erhebungen im Voraus zu sagen, ob eine Schwangere von Gingivitis befallen wird oder nicht. Der Eintritt der Gingivaveränderung war nur eine Frage der Zeit. Die Gingivitis gravidarum ist also abhängig von der Konstitution; Frauen mit exsudativer Diathese werden zur Zeit der Schwangerschaft bevorzugt davon befallen. Es besteht ähnlich einer Parodontosebereitschaft eine Bereitschaft zur Gingivitis gravidarum. Auf dem Boden einer konstitutionellen Kapillaranomalie entsteht durch die (hormonale, vegetative?) Umstimmung infolge der revolutionär sich auf den Gesamtorganismus auswirkenden Gravidität (ähnlich wie auch bei dem evolutionär wirkenden Menstruationszyklus bei der Gingivitis periodica) ein spastisch-atonischer Zustand in dem Zahnfleischraum.

Zusammenfassung: Die Gingivitis gravidarum ist eine zur Zeit der Schwangerschaft bestehende entzündliche Reaktion der Gingiva, die nach der Entbindung spontan abheilt. Alle Gravidae mit einer auf Grund der Anamnese festgestellten exsudativen Diathese werden von der Gingivitis gravidarum befallen. Wenn dieser Zustand auch gewöhnlich nicht (sondern nur unter bestimmten Zuständen) in einen krankhaften übergeht, eine chronische Entzündung sich nicht entwickelt, so steht doch der Beibehaltung der traditionellen Bezeichnung „Gingivitis gravidarum“ nichts im Wege, solange nur die Erkenntnis sich mit dem Namen verknüpft, daß ein Zustand gemeint ist, der, in den Grenzen des Physiologischen liegend, nur unter besonderen krankmachenden Umständen in das Pathologische übergeht. Der Eintritt der als Gingivitis gravidarum bezeichneten Form der Gingivaveränderung tritt zwischen dem vierten und siebten Schwangerschaftsmonat auf, zehn Tage bis drei Wochen post

partum können als Zeitraum für die Abheilung der entzündlichen Reaktion der Gingiva angenommen werden. Therapeutisch sind indifferente Mundpülmittel zu empfehlen. Von hervorragender Wirkung haben sich die Kamillozon-Tabletten erwiesen.

Literaturverzeichnis

1. **Arkövy:** Indikationen zur stomatologischen Therapie. Oestr. Ung. V. f. Z. (1911).
2. **Amoedo-Port:** Die Zahnheilkunde in der gerichtlichen Medizin. Leipzig (1900).
3. **Biro:** Untersuchungen über den Einfluß der Gravidität auf die Caries der Zähne. Ung. V. f. Z. (1898).
4. **Burckhard:** Dissertation. Frankfurt a. M. (1933).
5. **Chaim, A.:** Der hypertonisch-spastische Typ im Bilde der Parodontose. V. f. Z. H. 4, (1926).
6. **Charpentier:** Die Zahnfleischerkrankungen schwangerer Frauen. Ref. Wien Z. M. (1902).
7. **Coles:** Die Beschaffenheit des Mundes und der Zähne während der Schwangerschaft. Korresp. f. Zhk. (1874).
8. **Eifelt:** Medizinische Jahrbücher d. Oesterreichischen Staates, Band XXI (1840).
9. **Freund:** F. v. Winkel, Handbuch der Geburtshilfe II. Band, erster Teil.
10. **Grüner:** Die Beziehungen der Menstruation, der Schwangerschaft, der Geburt, des Wochenbettes und des Klimakteriums zu Erkrankungen d. Zähne. Verlag Gg. Thieme, Leipzig (1915).
11. **Hirfch:** Frauenheilkunde und Zahnheilkunde in ihren gegenseitigen Beziehungen. D. Z. W. (1910).
12. **Houpert:** Kontribution à l'étude etiologique des troubles gingivo dentaire. Bordeaux.
13. **Karoly:** Beobachtungen über Pyorrhoea alveolaris. Oester. Ung. V. f. Z. 1901, H. 2, 1902, H. 4.
14. **Karner:** Wiener Medizinische Wochenschr. Nr. 50 (1872).
15. **Kieffer:** Mund- und Zahnkrankheiten in Schwangerschaft und Wochenbett. Straßb. Med. Z. (1909).
16. **Loos, O.:** Parodontose-Konstitution und Prophylaxe. Parodontium 1930, Nr. 6.
17. **Loos, O.:** Klinische Beobachtungen zur Parodontose-Konstitution. Z. R. 37 Jahrg. Nr. 32.

18. **Pinard:** De la gingivite des femmes enceintes et de son traitement. Paris (1877).
 19. **Rosenstein:** Die Erkrankungen der Mundorgane in der Schwangerschaft. D. Mon. Schr. f. Z. H. 3, (1913).
 20. **Seitz-Halban:** Biologie und Pathologie des Weibes. Band VII/1.
 21. **Scheff, G.:** Handbuch der Zahnheilkunde, 3. Aufl. Wien u. Leipzig 1910.
 22. **Scholl, H.:** Ueber das Verhalten der Zahnfleischkapillaren bei Sulfitaumbildung. Diff. Frankf. a. M. 1919.
 23. **Schmidt, H. R.:** Zahnfleischschwellung (entzündliche und nicht-entzündliche) und Geschwulstbildung im Munde während der Schwangerschaft. V. f. Z. 43. Jahrg. H. 3, (1927).
-

Lebenslauf

Ich, Ernst Stroh, wurde als Sohn des Dr. med. dent. Ernst Stroh und seiner Ehefrau Marie am 11. Aug. 1907 zu Darmstadt geboren. Hier besuchte ich das „Hessische Realgymnasium“, an dem ich im Jahre 1928 die Reifeprüfung ablegte. Vom Wintersemester 1928 bis Sommersemester 1929 einschließlich studierte ich an der Universität Frankfurt a. M. Rechtswissenschaft. Zu Anfang des Wintersemesters 1929 unterzog ich mich einem Fakultätswechsel und studierte Zahnheilkunde. Der Universität Frankfurt a. M. gehörte ich ununterbrochen während der Zeit meines Studiums an. Im Dezember 1933 erwarb ich meine Approbation als Zahnarzt.

Es sei mir an dieser Stelle gestattet, meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Professor Dr. med. O. Loos, für die Ueberlassung der Arbeit und für die während ihrer Durchführung gewährten Anregungen meinen aufrichtigen Dank auszusprechen. Ferner Herrn Dr. med. Arntz, Assistenzarzt der Frauenklinik (Dir. Prof. Dr. O. Seitz), für die bereitwillige Unterstützung und Ueberlassung der Patientinnen.
